


# منحنی اپیدمی در استان چهارمحال و بختیاری

## گزارش شماره ۱۳



### تفسیر:

- ۱- تا ۱۱ ژوئن ۲۰۲۰ (۲۲ خردادماه ۹۹) استان چهارمحال و بختیاری در موج اول اپیدمی بوده است.
- ۲- در موج اول، حداقل ۶ پیک افزایش موارد بیماری نسبت به روزهای اپیدمی مشاهده شد.
- ۳- مرز اپیدمی با میانگین متحرک ۳ و ۵ روزه محاسبه و مشخص شده است.
- ۴- روند کشف موارد مثبت بیماری وابسته به تعداد نمونه گیری در روز برای کووید-۱۹ است.
- ۵- طول باند صعودی اپیدمی به نظر می رسد طولانی شده و از طرفی تا کنون به قسمت فلت منحنی نرسیده است.
- ۶- تا کنون استان وارد مرحله حاد اپیدمی کووید-۱۹ و افزایش جدی موارد بستری در بیمارستان نشده است.
- ۷- ردگیری موارد تماس، جداسازی بیماران، قرنطینه موارد مشکوک و تشخیص زودرس بیماران قویا توصیه می گردد.
- ۸- افزایش کیفیت ثبت داده ها و حداقل متغیرهای دموگرافیک بیماران بیشتر از قبل باید مورد توجه قرار گیرد.
- ۹- میزان کشندگی بیماری و درصدهای مرگهای منتسب به کووید ۱۹ نسبت به متوسط کشوری کمتر است.
- ۱۰- استان چهارمحال و بختیاری از جمله استان هایی بوده است که به دلیل شرایط جغرافیایی، اجتماعی، تراکم، محیط زیست و شرایط اپیدمیولوژیک اپیدمی کووید ۱۹ در ماه های نخست اپیدمی فراوانی کمتری از بیماران و مرگها نسبت به استان های دیگر داشته است. به نظر می رسد با گذشت زمان، استان درگیر اپیدمی حاد پیشرونده کووید-۱۹ شده و بروز تجمعی روزانه بیماری و مرگ های منتسب به آن به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد. بنابراین آمادگی نظام مراقبت بیماری و تقویت آن برای کنترل اپیدمی پیشنهاد و توصیه میشود.

**کمیته اپیدمیولوژی کووید-۱۹ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد**